




INFORMATION INFÖR GASTROSKOPI



Gastroskopi är en undersökning där man via munnen för ned ett flexibelt instrument med en kamera och undersöker matstrupe, magsäck och tolvfingertarmen.

Undersökningen utförs på fastande mage, det vill säga, **du får inte äta eller dricka 6 timmar före undersökningen.** **OBS! Är du diabetiker eller har medicinsk behandling mot övervikt behöver fastan förlängas till 12 timmar.**

Du kan ta dina läkemedel (med lite vatten) som vanligt på undersökningdagen dock minst 2 timmar före undersökningen.

VÄNLIGEN OBSERVERA

Ring din vårdcentral för rådgivning inför fastan om du har medicin mot diabetes. Kontrollera gärna ditt blodsocker innan undersökningen.

Kontakta oss om du har:

- Svår hjärtsvikt
- Nyligen haft hjärtinfarkt
- Om du har syrgasberoende lungsjukdom
- Om du inte kan gå på egen hand eller behöver hjälp av en annan person för att lägga dig eller ta dig upp från en brits.
- ICD pacemaker

SÅ SKALL DU GÖRA MED DINA LÄKEMEDEL

Diabetes

- Om du tar medicin för **diabetes mellitus**, måste du själv ta kontakt med din läkare eller diabetessjuksköterska för dosjustering av medicinen inför förberedelserna och undersökningen.

Om du tar blodförtunnande mediciner

Normalt rekommenderar vi nedanstående förfarande av blodförtunnande läkemedel, men i vissa fall kan undantag behöva göras. Kontakta därför din familjeläkare eller den klinik som sköter din blodförtunnande medicinering för råd.

- Behandlas du med **Waran[®]**, **Apekumarol[®]**, **Marcumar[®]** eller **Warfarin[®]** skall du senast 7 dagar före undersökning kontakta den mottagning som sköter behandlingen för utsättande av läkemedlet inför undersökningen.
- Behandlas du med **Plavix[®]**, **Clopidogrel[®]**, **Efient[®]**, eller **Brilique[®]** skall du 5 dagar före undersökning göra uppehåll med läkemedlet.
- Behandlas du med **Xarelto[®]**, **Eliquis[®]**, **Pradaxa[®]** eller **Lixiana[®]** skall du 1 dag före undersökning göra uppehåll med läkemedlet.
- Behandlas du med enbart **Fragmin[®]**, **Klexane[®]** eller **Innohep[®]** skall du inte ta läkemedlet undersökningsdagen.
- Övriga läkemedel, inklusive **Trombyl[®]**, kan du ta som vanligt undersökningsdagen, dock minst 2 timmar innan undersökningen.